

Ospedale Sacra Famiglia	CATECHOLAMINES URINAIRES	Cod:Mod.IO238.08	Rev. 1
Erba	ACIDE VANILMANDELIQUE	Data:13/04/17	
U.O. di Patologia Clinica	ACIDE 5-HYDROXYNDOLACETIQUE	Pag.1	Di 1

INSTRUCTIONS POUR LA RECOLTE DES URINE AU COURS DES 24 HEURES POUR LA DETERMINATION DE

ACIDE VANILMANDELIQUE

ACIDE 5 HYDROXINDOLACETIQUE

HYDROXYPROLINE

URINE METERSFRINE (epinephrine, norepinephrine)

CORTISOL URINAIRE

CUIVRE D'URINE

Se rendre d'abord en Laboratoire pour demander le récipient spécial pour la
récolte des urines. Le récipient contient acide chlorhydrique 6N.

- Faire attention au liquide (acide !) présente à l'intérieur du récipient: ne pas en renverser et ne pas le toucher avec les mains, car il peut être caustique.
- Garder le contenant hors de la portée des enfants.
- Commencez la récolte au matin, après avoir vidé la vessie à l'heure habituelle (par exemple à 7h00) : à partir de ce moment, recueillir toutes les urines pendant toute la journée et la nuit jusqu'à 7h00 du lendemain, y compris.
- Il est important de ne pas perdre aucune partie de la production d'urine.
- Branchez toujours bien le récipient.
- Gardez-le pendant la journée dans un endroit **frais (2-8°C) et sombre**.
- Délivrer le récipient avec l'urine au Centre des Prélèvements hospitalier de 8h00 à 10h00.