

Ospedale Sacra Famiglia	CATECOLAMINE URINARIE, ACIDO VANILMANDELICO, ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO	Cod:Mod.IO238.08	Rev. 1
Erba		Data:13/04/17	
U.O. di Patologia Clinica		Pag.1	Di 1

**ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE PER LA RACCOLTA DELLE URINE DURANTE LE 24 ORE
PER LA DETERMINAZIONE DI:**

**ACIDO VANILMANDELICO
ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO
IDROSSIPROLINA
METANEFINE URINARIE
CORTISOLO URINARIO
RAME URINARIO**

Passare prima in Laboratorio Analisi per il ritirare il bidone di raccolta contenente
Acido Cloridrico 6N.

- Fare attenzione al liquido conservante (acido) presente all'interno del contenitore precedentemente ritirato in Laboratorio: non rovesciarlo e non toccarlo con le mani, perché può essere caustico.
- Tenere il contenitore lontano dalla portata dei bambini.
- Iniziare la raccolta al mattino, dopo aver vuotato la vescica alla solita ora (per esempio alle 7.00) e, da quel momento in poi, raccogliere tutte le urine successive durante tutta la giornata e la notte sino alle ore 7.00 comprese del giorno successivo.
- E' importante non perdere assolutamente parte dell'urina emessa.
- Tappare sempre bene il contenitore.
- Conservarlo durante la giornata in luogo fresco (**2-8°C**) e al buio (solo, Idrossiprolina).
- Consegnare il contenitore con le urine al Centro Prelievi dalle ore 8.00 alle ore 10.00.