

OSPEDALE SACRA FAMIGLIA	CONSIGLI	Cod.Mod.352.07	Rev.0
ERBA	PER	Data: 07/11/11	
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA	ESTRAZIONE DENTARIE	da pag.1	a pag.1

PROVINCIA LOMBARDO VENETA-ORDINE OSPEDALIERO

DI

SAN GIOVANNI DI DIO -FATEBENEFRAPELLI

SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA

22036 -ERBA (CO)- Via Fatebenefratelli, 20

Telefono 031 638 265 -Fax 031 638 263

Laboratorio Analisi- CENTRO SORVEGLIANZA ANTICOAGULATI – ERBA N° 136

Consigli ai pazienti in Terapia Anticoagulanti Orale (TAO) in caso di estrazione dentarie o di procedura di ablazione del tartaro.

- Informare il dentista che siete in TAO e se possibile prendere l'appuntamento per la mattina.
- Informare il centro TAO e presentarsi per il prelievo 4-5 giorni prima della data prevista per l'intervento.
- Nei giorni che precedono il lavoro del dentista, effettuare sciacqui con lorexidina di gluconato al 0.12% (PLAK-OUT 0.12%, o DENTOSAN collutorio) due volte al giorno, mattino e sera.
- Il giorno prima oppure il giorno dell'intervento effettuare controllo del PT-INR. **NON RIDURRE NE SOSPENDERE LA DOSE DELL'ANTICOAGULANTE**, salvo specifica indicazione di un medico del Centro TAO.
- Procurarsi 6 scatole di TRANEX o di UGUROL (farmaco in categoria A; Ricetta medica).
- Dal giorno stesso e per 7 giorni successivi l'estrazione o l'ablazione del tartaro, effettuare sciacqui con TRANEX o UGUROL OPERANDO NEL SEGUENTE MODO:
 - Diluire il contenuto di una fiala con pari quantità di acqua
 - Tenere il liquido in bocca e sciacquare per due minuti
 - Sputare
 - Ripetere l'operazione 4 volte al giorno (dopo colazione, dopo il pranzo, nel pomeriggio ed alla sera).
 - Non assumere cibo e non bere per un'ora dopo gli sciacqui.
 - Continuare per 7 giorni. (Le emorragie postestrattive possono avvenire in 4°-5° giornata).
- In caso di sanguinamento continuo applicate un tampone di cotone idrofilo o garza imbevuta di TRANEX o UGUROL diluiti e premere a lungo.
- Nei giorni successivi disinfettare il cavo orale con sciacqui con PLAK-OUT o DENTOSAN 2 volte al giorno.

NB: SI RACCOMANDA AI PORTATORI DI PROTESI VALVOLARI LA PROFILASSI ANTIBIOTICA PER L' ENDOCARDITE BATTERICA.