

OSPEDALE SACRA FAMIGLIA	CONSIGLI	Cod.Mod.IO352.11	Rev.0
ERBA	PER I NUOVI	Data: 21/03/16	
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA	ANTICOAGULANTI ORALI	da pag.1	a pag.1

Gent. Paziente,

Le è stato prescritto un nuovo farmaco anticoagulante, con azione diversa rispetto a Coumadin (warfarin) e Sintrom (acenocumarolo) per il quale è necessario la prescrizione di un PIANO TERAPEUTICO della durata di un anno eventualmente rinnovabile.

NON NECESSITA CONTROLLO INR

Non deve più usare la nostra ricetta per la TAO

Non ci sono interazioni con il cibo

Deve **consultare il suo curante** in caso di introduzione nuovi farmaci

Fondamentali i controlli esami del sangue, in particolare EMOCROMO, TP, PTT CREATINEMIA, AZOTEMIA, TRANSAMINASI, BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA **A 3 MESI, 6 MESI, 1 ANNO** (prima del rinnovo del Piano Terapeutico) o secondo le condizioni cliniche del paziente.

In caso di nuovi problemi clinici (es. SANGUINAMENTI, BRUCIORE INTESTINALE...) **rivolgersi al curante**, che valuterà l'eventuale riferimento allo specialista.

SE ASSUME:

PRADAXA (Dabigatran etexilato) :

Il farmaco va assunto 1cp al mattino ed 1 cp alla sera; in caso di dimenticanza è possibile assumere la pastiglia entro le 6 ore successive; altrimenti salta alla dose successiva.

Il farmaco va assunto a stomaco pieno con un bel bicchiere d'acqua.

NON ROMPERE LA CAPSULA!

XARELTO (Rivaroxaban):

Il farmaco va assunto 1cp a stomaco pieno. In caso di dimenticanza è possibile assumere la pastiglia entro le 12 ore successive; altrimenti salta alla dose successiva.

ELIQUIS (Apixaban):

Il farmaco va assunto 1cp al mattino ed 1 cp alla sera; in caso di dimenticanza è possibile assumere la pastiglia entro le 6 ore successive; altrimenti salta alla dose successiva.